Mourisco tinto

Vass8R12s196-200



INRA Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp14

Mourisco tinto

8 R 12 s. 196 - 200





14

DESIGNATION : Mourisco tinto

CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 196-200

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7-86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 20x20

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 4 JUS : inc. - coloré

~~s5~~ 7

CLOS 8 RANG 12 Souche 196-200

DESIGNATION : Mourisco tinto (148914)

CHARGE : Année :

Véraison : 28.7 8

Maturité : 12-9.88

Mill. : 0 Pour. : 0 +4

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 19

L - M - C le plus souvent

Vigueur : 3,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 22

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 6 JUS : inc. - coloré

s3 7

s4 7

s5 L

ANNEE 1987

NOM Maurisco tinto n EMPLACEMENT 8 R12 s 196-200

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	31.3	3.4	2		1.6.7	3.6	10.6				
2	3	31.3	3.4	2		3.6	5.6	10.6				
3	3	23.3	7.4	1		3.6	5.6	10.6	30.7	3.8	6.8	8.9
4	4	31.3	3.4	2		3.6	5.6	10.6		+2		+3
5	/											
	14			7	5							

4.4 +8 (Débourrement mi/déb)

4.6 −3 (Floraison mi/f)

Port mi érigé

Vigueur 3

ANNEE 1988

NOM Mourisco tinto EMPLACEMENT 8 R 12 s 196-200

f

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	5.4	8.4	3								
2	4	1.4	5.4	6								
3	5	5.4	8.4	7	13	31.5	3.6	6.6	28.7	4.8	12.8	12.9
4	4	5.4	8.4	7								
5	f											

Pourriture : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3,5 bonne

7.4 +14 (Débourrement mi/déb)

3.6 +3 (Floraison mi/f)

+2 (Véraison mi/v)

+4 (Maturité)

ANNEE 1989

NOM Mourisco tinto 1489 14

EMPLACEMENT 8 R12 s 196-200

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	4	20 3	23 3	4		24.5	27.5	30.5				
2	4	16 3	20 3	2	5,6		0					
3	4	16 3	20 3	1					24 7	31,7	7,8	
4	4	16 3	20 3	2						+2		
5 g												

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3,5

D le 20.3.89 +2

ANNEE 1991

NOM Mourisco tinto 1489-14

EMPLACEMENT 8 Rg 12 s 196.200

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	5			4		4.6	7.6	11.6	3.8	8.8	20.8	
2	6			6			+7			+2		
3	4			5								
4	5			6								
5 g												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ½ érigé Vigueur : 4

Mourisco tinto

DESIGNATION :
EMPLACEMENT : cl 8 R12 s - 196 - 200 (s196)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 (fortement) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 (légt. 3e) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Mourisco tinto

Désignation : clos 8 R 12 s. 196-200 (=196)
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 légt -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 fortement -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 légt 4e - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 légt -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Mourisco tinto -

Désignation :

Emplacement : clos 8 R 12 s - 196 - 200 (= 196)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

à raies très légt. colorées

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Mourisco tinto

N° d'ordre :
Désignation : 8 R 12 s 196.200 (s.197)
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 légt. - duveteux 148 - cotonneux 149 - ~~sans~~ avec villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 légt. - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 ou - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 - partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre : Mourisco tinto

Désignation : 8 R 12 a - 196·200 (1.193)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 18 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille (assez) régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 20).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION : Maurisco tinto
EMPLACEMENT : 8 R 12 s 196 . 200 (s.5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt. saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....11..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt. - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Mourisco tinto

Emplacement : 8R12 s.196-200

Angle des nervures : (1) - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - (8) - 9

L_2/L : (10) - (11)

Nombre de lobes : (12) - (13) - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : 40 - (41)

Dents (angle) : (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües